

# Клинические симптомы, требующие незамедлительного обращения к акушеру-гинекологу



**Информация о клинических симптомах,**  
требующих незамедлительного обращения  
к врачу-акушеру-гинекологу

**Вы должны  
незамедлительно обратиться  
к врачу-акушеру-гинекологу  
при появлении следующих жалоб:**



- рвота более 5 раз в сутки;
- потеря массы тела более 3 кг за 1 – 1,5 недели;
- повышение артериального давления выше 140/90 мм рт. ст.;
- проблемы со зрением, такие как размытие или мигание перед глазами;
- сильная головная боль;
- боль внизу живота любого характера (ноющая, схваткообразная, колющая и др.);
- боль в области желудка;
- отек лица, рук или ног, снижение количества выделяемой мочи
- появление кровянистых или обильных жидких выделений из половых путей;
- повышение температуры тела выше 37,5;
- отсутствие или изменение шевелений плода на протяжении более 12 часов после 20 недель беременности).

Вы должны незамедлительно обратиться к врачу-акушеру-гинекологу при появлении следующих жалоб:

- рвота более 5 раз в сутки;
- потеря массы тела более 3 кг за 1 - 1,5 недели;
- повышение артериального давления выше 120/80 мм рт. ст.;
- проблемы со зрением, такие как размытие или мигание перед глазами;
- сильная головная боль;
- боль внизу живота любого характера (ноющая, схваткообразная, колющая и др.);
- боль в области желудка;
- отек лица, рук или ног;
- появление кровянистых или обильных жидких выделений из половых путей;
- повышение температуры тела выше 37,5;
- отсутствие или изменение шевелений плода на протяжении более 12 часов (после 20 недель беременности).